

# 청계천 식물상 지도



**St. 1**  
물억새  
달뿌리풀  
키버들  
노랑꽃창포  
짚레  
수크령  
조팝나무  
수호초  
갯버들


**St. 2**  
물억새  
갈대  
달뿌리풀  
키버들  
비짜루국화  
노랑꽃창포  
수크령  
벌개미취  
능소화

**St. 3**  
물억새  
갈대  
키버들  
갯버들  
줄  
수크령  
꼬리조팝  
좀작살나무

**St. 4**  
물억새  
등근잎유홍초  
매듭풀  
명아주  
환삼덩굴  
망초  
꼬리조팝  
개망초  
억새

## 범례

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1 모전교    | 14 버들다리   |
| 2 광통교    | 15 오간수교   |
| 3 세월교    | 16 맑은내다리  |
| 4 광교     | 17 다산교    |
| 5 장통교    | 18 영도교    |
| 6 삼일교    | 19 황학교    |
| 7 수표교    | 20 비우당교   |
| 8 관수교    | 21 무학교    |
| 9 세운교    | 22 두물다리   |
| 10 배오개다리 | 23 고산자교   |
| 11 새벽다리  | 24 신답철교   |
| 12 마전교   | 25 제2마장교  |
| 13 나래교   | 26 인도교    |
| 조류       | 27 증랑천합류부 |
| 어류       | △ 보호종     |
| 양서파충류    | ⊘ 위해종     |
| 저서무척추동물  | 고유종       |
| 육상곤충     |           |
| 식물       |           |



갯버들



환삼덩굴



애기똥풀




수크령



박주가리



짚레



붉은토끼풀



고들빼기

### 노랑꽃 창포 *Iris pseudoacorus*

유럽 원산이며 연못가에 많이 심는다. 뿌리줄기는 짧고 수염뿌리는 황갈색이다. 꽃줄기는 가지가 갈라지며 높이 60-100cm. 잎은 길이 약 1m이고, 나비 23cm이다. 꽃은 5월에 노란색으로 피며 꽃 밑에 2개의 큰 포가 있다. 외화피는 3개로 넓은 달걀 모양이고 밑으로 처지며 밑부분이 좁아지고, 내화피는 3개이며 긴 타원형이다. 암술대는 3개로 갈라진 다음 다시 2개로 갈라지며 갈라진 조각에는 뾰족한 톱니가 있다. 3개의 수술은 암술대가 갈라진 밑부분과 붙어 있다. 씨방은 하위로 통꼴이고 황색이다.

### 등근잎유홍초 *Quamoclit angulata*

능조라라고도 한다. 열대 아메리카 원산이며 관상용으로 심는다. 덩굴은 나팔꽃처럼 자라면서 왼쪽으로 감아 올라간다. 길이는 3m 내외이다. 잎은 어긋나고 잎자루가 길며 심장 모양 원형이다. 잎 끝이 갑자기 뾰족해지며 밑부분의 양쪽 끝이 뾰족한 각으로 된다. 꽃은 8-9월에 피고 노란빛을 띤 홍색이며 긴 꽃대 끝에 35개씩 달린다. 꽃은 나팔꽃을 축소시킨 것과 같은 모양이고 꽃받침, 수술은 각각 5개씩, 암술은 1개이다. 열매는 삭과로 등글고 9월에 익으며 꽃받침이 남아 있다. 유홍초와 비슷하지만 잎이 갈라지지 않는다.